

RELEVÉ D'AUTOMESURE TENSIONNELLE

Pour affirmer le diagnostic d'une hypertension artérielle et pour mettre en place un traitement adapté et efficace, le médecin propose la réalisation d'un relevé d'automesure par le patient lui-même. En effet, la tension artérielle d'une personne en bonne santé n'est pas stable. Elle fluctue en fonction de l'environnement. Émotion, stress, activité physique... influent directement sur la pression artérielle.



QUAND EFFECTUER LA MESURE DE VOTRE TENSION ?

La règle des **3 mesures** :

- La tension artérielle est mesurée **3 fois le matin** au début du petit-déjeuner avant toute prise de médicaments et **3 fois le soir** avant le coucher (avec un intervalle de 2 minutes entre chaque mesure) ;
- Pendant **3 jours consécutifs**.

Modalités de mesure de la tension : en position assise, après 5 minutes de repos.



COMMENT REMPLIR LE RELEVÉ D'AUTOMESURE TENSIONNELLE ?

Inscrivez tous les chiffres qui apparaissent sur l'écran du tensiomètre pour la pression systolique et diastolique.

- **Systolique** = pression systolique = pression maximum
- **Diastolique** = pression diastolique = pression minimum

Calculez votre moyenne :

- moyenne systolique > additionnez l'ensemble des mesures systoliques et divisez par 18
- moyenne diastolique > additionnez l'ensemble des mesures diastoliques et divisez par 18

En cas de doute, votre médecin effectuera cette moyenne.

Nom : Prénom :

Période du relevé du / / au / / Traitement :

JOUR 1			JOUR 2			JOUR 3		
	systolique	diastolique		systolique	diastolique		systolique	diastolique
MATIN			MATIN			MATIN		
Mesure 1			Mesure 1			Mesure 1		
Mesure 2			Mesure 2			Mesure 2		
Mesure 3			Mesure 3			Mesure 3		
SOIR			SOIR			SOIR		
Mesure 1			Mesure 1			Mesure 1		
Mesure 2			Mesure 2			Mesure 2		
Mesure 3			Mesure 3			Mesure 3		

MOYENNE
SYSTOLIQUE

MOYENNE
DIASTOLIQUE